

Ordination

Prof.Dr. Manfred Frey
Feldgasse 23/15 A-1080 Wien
Tel +43 (0)1 409.09.09
Fax +43 (0)1 409.09.09-4

Confraternität

Privatklinik Josefstadt
Skodagasse 32 A-1080 Wien
Tel +43 (0)1 401.14-0

Internationales Zentrum für Facialischirurgie

Prof. Dr. Manfred Frey
International Center for Facial Nerve Surgery
Feldgasse 23/15 A-1080 Wien
Tel +43 (0)1 409.09.09
Fax +43 (0)1 409.09.09-4

BODYLIFT

KURZINFO

OP-Dauer:	ca. 4 - 6 Stunden (je nach Umfang)
Anästhesie:	Vollnarkose
Klinikaufenthalt:	8 - 12 Nächte
Gesellschaftsfähig:	nach ca. 3 Wochen
Sport:	nach ca. 8 Wochen

Das natürliche Vermögen der Haut, sich an die wesentlich kleineren Volumenverhältnisse nach exzessiver Gewichtsreduktion durch eigene Elastizität wieder anzupassen, sind in den meisten Fällen so weitgehend begrenzt, dass eine operative Entfernung der ausgebildeten Hautschürzen im Bereich des Bauches, des Rückens, des Gesäßes und der Oberschenkel nur operativ im Rahmen eines sogenannten Bodylifts, einer großen einzeitigen Straffungsoperation, zu korrigieren sind.

Diese allerdings recht große, mehrstündige Operation findet in Vollnarkose statt. Die überschüssigen Hautareale am Rücken und am Gesäß werden zunächst in Bauchlage über einen letztlich im Slip-Bereich um den gesamten Körper herumgeführten Schnitt entfernt und belassenes Unterhautfettgewebe mit Haltefäden so positioniert, dass die Gesäßrundung besser definiert und geformt ist. Die Haut der Oberschenkelrück- und Außenseite wird von den Muskelfaszien abgelöst und so nach oben mobilisiert und gestrafft. Nach Verschluss der rückseitigen Wunden erfolgt die Umlagerung in Rückenlage, sodass nun die Bauchschürze unter Neupositionierung des Bauchnabels entfernt werden kann, zusätzlich werden die herabhängenden Innenseiten der Oberschenkel über einen halbmondförmigen Schnitt von der Leiste über die Schrittreion bis in die Gesäßfalte gestrafft. Die umfangreiche Mobilisation und die ausgedehnten Wundflächen erfordern das Tragen einer maßgeschneiderten, elastischen Kompressionskleidung vom Oberkörper bis über die Knie durch ca. 8 Wochen. Infolge der ausgedehnten Operation in mehreren Körperregionen ist auch ein stationärer Aufenthalt von ca. 10 Tagen notwendig. In einzelnen Fällen sind Bluttransfusionen nicht zu vermeiden.