

Ordination

Prof.Dr. Manfred Frey
Feldgasse 23/15 A-1080 Wien
Tel +43 (0)1 409.09.09
Fax +43 (0)1 409.09.09-4

Confraternität

Privatklinik Josefstadt
Skodagasse 32 A-1080 Wien
Tel +43 (0)1 401.14-0

Internationales Zentrum für Facialischirurgie

Prof. Dr. Manfred Frey
International Center for Facial Nerve Surgery
Feldgasse 23/15 A-1080 Wien
Tel +43 (0)1 409.09.09
Fax +43 (0)1 409.09.09-4

OBER- UND UNTERLIDSTRAFFUNG

KURZINFO

OP-Dauer:	
Oberlidplastik	1,5 Stunden
Unterlandplastik	1,5 - 2 Stunden
Anästhesie:	örtliche Betäubung oder Vollnarkose
Klinikaufenthalt:	ambulant bzw. 1 Nacht
Gesellschaftsfähig:	
Oberlidplastik	nach ca. 10 Tagen
Unterlandplastik	nach ca. 2 Wochen
Sport:	nach 3 Wochen

Der durch altersbedingten Elastizitätsverlust verursachte Hautüberschuss an den Lidern führt an den Oberlidern (Schlupflidern) zu einem Überhang einer Hautfalte gegen die Wimpern und oft auch zu einer Gesichtsfeldeinschränkung von oben seitlich, an den Unterlidern durch die Kombination des Hautüberschusses mit einem Vorwölben des Fettgewebes der Augenhöhle zu sogenannten Tränensäcken. Neben dem müden oder traurigen Blick kann es auch zu funktionellen Störungen mit Ermüdung der Augen beim Lesen oder Bildschirmarbeiten aufgrund des andauernden Versuches der Kompensation durch aktive Brauenanhebung kommen.

Da die Operationsnarben in der Regel nur sehr gering ausgebildet werden und in den natürlichen Lidfalten zu verstecken sind, ist die Lidplastik als ein in Lokalanästhesie ambulant durchgeführter Eingriff einer der häufigsten kosmetischen Operationen.

Mit überschaubarem, chirurgischem Aufwand kann ein sehr deutlicher und überzeugender Effekt erzielt werden. Die Augen kommen offen und strahlend wieder zur Geltung und vermitteln eine positive Ausstrahlung und Lebensfreude.

Oberlidstraffung:

Die beidseitige Oberlidplastik in örtlicher Betäubung kann als ambulanter Eingriff durchgeführt werden. Die Entfernung des Haut-, Muskel- oder auch Fettgewebsüberschusses wird über einen Zugang durchgeführt, dass die resultierende Narbe exakt in die natürliche Oberlidfalte zu liegen kommt. Diese wird wieder an richtiger Stelle definiert. Die Wunden werden mit feinsten Nähten verschlossen, welche gemeinsam mit den Klebestreifenverbänden unter Meidung von Wasser 8 Tage belassen werden müssen.

Ordination

Prof.Dr. Manfred Frey
Feldgasse 23/15 A-1080 Wien
Tel +43 (0)1 409.09.09
Fax +43 (0)1 409.09.09-4

Confraternität

Privatklinik Josefstadt
Skodagasse 32 A-1080 Wien
Tel +43 (0)1 401.14-0

Internationales Zentrum für Facialischirurgie

Prof. Dr. Manfred Frey
International Center for Facial Nerve Surgery
Feldgasse 23/15 A-1080 Wien
Tel +43 (0)1 409.09.09
Fax +43 (0)1 409.09.09-4

OBER- UND UNTERLIDSTRAFFUNG

KURZINFO

OP-Dauer:	
Oberlidplastik	1,5 Stunden
Unterlandplastik	1,5 - 2 Stunden
Anästhesie:	örtliche Betäubung oder Vollnarkose
Klinikaufenthalt:	ambulant bzw. 1 Nacht
Gesellschaftsfähig:	
Oberlidplastik	nach ca. 10 Tagen
Unterlandplastik	nach ca. 2 Wochen
Sport:	nach 3 Wochen

(Fortsetzung)

Unterlandstraffung:

Auch die Unterlidstraffung kann meistens in Lokalanästhesie im Rahmen eines ambulanten Eingriffes durchgeführt werden. Wird Vollnarkose bevorzugt, ist der Verbleib über Nacht im Spital sinnvoll. Hier liegt die Schnittführung knapp unter der Wimpernreihe des Unterlides, sodass die kaum sichtbare Narbe zusätzlich von der unteren Wimpernreihe verdeckt wird.

Am Unterlid steht weniger die Hautentfernung im Vordergrund, sondern vielmehr die Hebung und Straffung des Unterlides, um gleichzeitig der Schwerkraft entgegenzuwirken. Oft wird zur Aufhebung der „Ringe unter den Augen“ Fettgewebe der Augenhöhle zur Auffüllung dieser Einsenkung vorverlagert. Dadurch wird das Zuviel der Tränensäcke zur Auffüllung des Zuwenig der Ringe unter den Augen verwendet. Bei der Unterlidplastik müssen die feinen Nähte und der Klebestreifenverband ebenfalls 8 Tage ohne Wasser belassen werden. In der Regel dauert die Schwellung im Bereich des Unterlides nach der Operation etwas länger als die des Oberlides. Dennoch kann mit Gesellschaftsfähigkeit nach ca. 2 Wochen gerechnet werden.