

Ordination

Prof.Dr. Manfred Frey
Feldgasse 23/15 A-1080 Wien
Tel +43 (0)1 409.09.09
Fax +43 (0)1 409.09.09-4

Confraternität

Privatklinik Josefstadt
Skodagasse 32 A-1080 Wien
Tel +43 (0)1 401.14-0

Internationales Zentrum für Facialischirurgie

Prof. Dr. Manfred Frey
International Center for Facial Nerve Surgery
Feldgasse 23/15 A-1080 Wien
Tel +43 (0)1 409.09.09
Fax +43 (0)1 409.09.09-4

STIRNSTRAFFUNG

KURZINFO

OP-Dauer:	1 - 1,5 Stunden
Anästhesie:	Vollnarkose
Klinikaufenthalt:	ca. 2 Nächte
Gesellschaftsfähig:	nach ca. 2 Wochen
Sport:	nach 4 Wochen

Das Stirnlifting oder obere Facelift strafft die Haut der Stirnregion, beseitigt tiefe Stirnfalten durch Schwächung der Stirnmuskulatur und bringt die abgesunkenen Augenbrauen in ihre ursprüngliche Position zurück. Dadurch wird ein müder oder grimmiger Gesichtsausdruck frischer, der Blick offener. Dabei ist die Wechselwirkung der Brauenposition mit einem Hautüberschuss an den Oberlidern zu berücksichtigen. In manchen Fällen ist die verbessernde Wirkung im Bereich der Oberlider durch die Stirnstraffung alleine ausreichend, in manchen ist die ergänzende Oberlidplastik notwendig.

Die Anwendung endoskopischer Operationstechniken hat gerade beim Stirnlift eine wesentliche Verbesserung gebracht: über drei kurze senkrechte Hautschnitte innerhalb der Stirnhaargrenze wird die Stirnhaut gestrafft, die Augenbrauen gehoben und die tiefen Stirnfalten von innen durch Schwächung der Stirnmuskulatur beseitigt. Nur bei zu hoher Stirn ist es notwendig, entlang der Stirnhaargrenze auch Haut zu entfernen.

Der weiche Druckverband schließt die Stirnregion bis zu den Augenbrauen ein. Der Bereich der Augenlider ist häufig durch Schwellung und Blutergüsse mitbetroffen, welche jedoch nach zwei Wochen im wesentlichen resorbiert sind und dann ist eventuell mit etwas kosmetischer Abdeckung auch die Gesellschaftsfähigkeit wiederhergestellt.